

↓ 感染症発生動向調査 週間コメント

 《 疾病別 推移グラフ 》
 《 月別 集計コメント 》

第36週 (R4.9.5~R4.9.11)

■ 今週のトピックス

▽ 今週(2022年第36週:9/5-9/11)はインフルエンザが9週連続で報告あり、A/H3型の分離報告があります。RSウイルス感染症は多発が続きます。手足口病はやや増加、ヘルパンギーナはやや減少で、今後の動向に注意が必要です。その他の疾患は全般的に報告数は少ない。コロナの報告が非常に多く、定点からの任意の報告をCOVID-19として記載しています。R4年1/5に発令されたまん延防止等重点措置は3/21までで全て解除された。福岡県はR4.7/6にコロナ警報、7/22に特別警報を発動、9/14に警報へ変更された。


病 名	定点報告 数	前週比	主な増加地区等	1定点当たりの患者数	
				福岡県	全国
インフルエンザ	21	-9	福岡13、北九州6	0.11	0.03
RSウイルス感染症	228	92%	福岡129、北九州49	1.90	1.44
咽頭結膜熱	16	-2	福岡11、筑後3	0.13	0.07
A群溶連菌咽頭炎	92	88%	福岡76、筑後11	0.77	0.28
感染性胃腸炎	324	85%	福岡118、北九州107	2.70	2.10
水 痘	11	±0	福岡6、筑後5	0.09	0.05
手足口病	190	121%	福岡132、筑後35	1.58	3.74
伝染性紅斑	1	-9	筑後1	0.01	0.01
突発性発しん	52	91%	福岡22、筑後14	0.43	0.27
ヘルパンギーナ	71	75%	福岡58、筑後9	0.59	0.89
流行性耳下腺炎	7	+3	北九州4、福岡3	0.06	0.03
川崎病(MCLS)	4	-2	北九州3、筑豊1	0.03	
マイコプラズマ肺炎	0	±0		0.00	0.01
クラミジア肺炎	0	±0		0.00	
細菌性髄膜炎	0	±0		0.00	0.02
無菌性髄膜炎	0	±0		0.00	0.01
急性脳炎	0	±0		0.00	
急性出血性結膜炎	0	±0		0.00	0.00
流行性角結膜炎	1	-3	筑後1	0.04	0.22
性器クラミジア感染症	28	+1	福岡13、北九州7	0.76	
性器ヘルペス	2	+1	筑後1、福岡1	0.05	
尖圭コンジローマ	1	-2	福岡1	0.03	
淋菌感染症	12	+2	福岡6、筑後3	0.32	

※ 全数報告疾病 35週(定点報告数は36週分)


病 名	定点報告 数	全数報告 数(累計)	主な報告地区等	全国報告数(累計)
百日咳	0	0(8)		8(328)
風しん	0	1(2)	筑後1	2(8)
麻疹	0	0(0)		0(6)
梅 毒	5	3(332)	福岡3	190(8155)

■インフルエンザ（福岡県全域）

2022年 第36週 現在




オーストラリアにおけるインフルエンザ検出数（2017/1～2022/8）



出典：Australian Influenza Surveillance Report No. 11 – 15 August to 28 August 2022


インフルエンザワクチンの供給量の年次推移

令和4年度のワクチンの供給量は、記録がある中で過去最大の約3,521万本（成人では約7,042万回分）となる見込み（記録がある中で過去最大であった令和2年度の使用量（約3,274万本）と比べても約7.5%多い量）



インフルエンザワクチンの累積供給量（週次）

令和4年度は9月末の時点で約1,670万本が出荷される予定で、早期に多くの量のワクチンが出荷される見込み。



Q 新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。

A 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種については、単独で接種した場合と比較して、有効性及び安全性が劣らないとの報告があること等を踏まえ、令和4年7月22日開催の審議会において議論された結果、実施が可能となりました。

一方、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンの同時接種については、現時点で安全性に関する十分な知見が得られていないため、実施できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。特に子どもの場合は、定期接種でワクチンを接種することもあるため、予め計画を立てた上での予約をお願いします。

（例）4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、4月15日（2週間後の同じ曜日の日）以降になります。

なお、創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては、例外として2週間を空けずに接種することが可能です。

（参考資料）

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種の有効性・安全性（第33回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋）

法人番号6000012070001

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111（代表）

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved.

テーマから探す
 ▼

 目的から探す
 ▼

組織から探す

[トップページ](#) > [健康・福祉・子育て](#) > [感染症対策](#) > [HIV／エイズ・性感染症](#) > 【注意！】梅毒の感染者が例年に比べてとても増えています(症状に関する写真も掲載しています)

【注意！】梅毒の感染者が例年に比べてとても増えています(症状に関する写真も掲載しています)

更新日:2022年9月15日更新



【注意！】梅毒の感染者が例年に比べてとても増えています(症状に関する写真も掲載しています)

— 目次 —

1. [梅毒の感染者の増加について](#)
2. [梅毒の発生状況](#)
3. [梅毒とは](#)
4. [梅毒の感染経路について](#)
5. [梅毒の治療](#)
6. [梅毒の感染予防](#)
7. [梅毒の検査](#)
8. [梅毒の症状について\(詳細解説\)](#)

1. 梅毒の感染者の増加について

現在、全国的に梅毒の感染者が増加しています。福岡県でも、例年に比べ多い報告数となっており、1週間毎の累積感染者数は昨年(令和3年)の**約1.5倍増加**(第36週時点)しています。このままのペースが続くとこれまでにない感染拡大に繋がる恐れがあり、県民の皆様にご注意喚起するとともに、感染の予防、そして拡大を防止し、あなたと大切なパートナーを守るため、検査の受検や気になる症状がある場合には、医療機関の受診を呼びかけるものです。

2. 梅毒の発生状況


●年間の報告数

	平成29年	平成30年	平成31 (令和元)年	令和2年	令和3年 (※1)	令和4年 (※2)
全国	5,826	7,007	6,642	5,867	7,873	8,155
福岡県	227	321	277	314	349	340

※1 令和3年の報告数は速報値であり、今後変更の可能性あります。

※2 全国にあつては第35週(8月29日から9月4日)までの、福岡県にあつては第36週(9月5日から9月11日)までの累計です。全国の報告数については、県の公表から1週間遅れます。

●福岡県内週毎の報告数(令和元年～令和4年比較)



3. 梅毒とは

梅毒は、性的な接触(他人の粘膜や皮膚と直接接すること)などによってうつる感染症です。原因は梅毒トレポネーマという病原菌で、性行為によって感染し、感染した部位にしこりができるなど、感染後の経過期間によって様々な症状が出ます。(詳しくは、後段にて写真付きで解説しています)

早期の薬物治療で完治が可能です。検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあります。また、妊娠している人が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、死産、早産、新生児死亡、奇形が起こることがあります(先天梅毒)。

時に無症状になりながら進行するため、治ったことを確認しないで途中で治療をやめてしまわないようにすることが重要です。また完治しても、感染を繰り返すことがあり、再感染の予防が必要です。

4. 梅毒の感染経路について

主な感染経路は、感染部位と粘膜や皮膚の直接の接触です。具体的には、性器と性器、性器と肛門(アナルセックス)、性器と口の接触(オーラルセックス)等の性行為が原因となります。

5. 梅毒の治療

一般的には、外来で処方された抗菌薬を内服することで治療します。内服期間等は病期により異なり、医師が判断します。病変の部位によっては入院のうえ、点滴で抗菌薬の治療を行うこともあります。

医師が治療を終了とするまでは、処方された薬は確実に飲みましょう。性交渉等の感染拡大につながる行為は、医師が安全と判断するまではひかえましょう。

また、周囲で感染の可能性がある方(パートナー等)と一緒に検査を受け、必要に応じて、一緒に治療を行うことが重要です。

6. 梅毒の感染予防

感染部位と粘膜や皮膚が直接接触をしないように、必ずコンドームを使用しましょう。ただし、コンドームが覆わない部分の皮膚などでも感染がおこる可能性があるため、コンドームを使用しても、100パーセント予防できると過信はせず、皮膚や粘膜の異常など気になる症状があった場合は性的な接触を控え、早めに医療機関を受診して相談しましょう。

7. 梅毒の検査

県内の保健所等で、HIVや梅毒などの性感染症の検査を匿名で受けることができます。

検査を受けられる保健所等の一覧は、下記のファイルをご確認ください。

[HIV・性感染症検査を実施している保健所等の一覧\(令和4年6月15日現在\) \[PDFファイル／139KB\]](#)

現在、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一部の保健所で検査を休止しています。

検査をご希望の場合は、保健所に検査を実施しているかご確認ください。

8. 梅毒の症状について(詳細解説)

感染したあと、経過した期間によって、症状の出現する場所や内容が異なります。

第1期:感染後約3週間

初期には、感染がおきた部位(主に陰部、口唇部、口腔内、肛門等)にしこりができることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。痛みがないことも多く、治療をしなくても症状は自然に軽快します。

しかし、体内から病原体がいなくなったわけではなく、他の人にうつす可能性もあります。感染した可能性がある場合には、この時期に梅毒の検査が勧められます。



(写真)感染から約3週間後、唇にくぼみができている様子

写真提供:一般社団法人日本性感染症学会

第2期:感染後数か月

治療をせずに3か月以上を経過すると、病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひら、足の裏、体全体にうっすらと赤い発疹が出る場合があります。小さなバラの花に似ていることから「バラ疹(ばらしん)」とよばれています。

発疹は治療をしなくても数週間以内に消える場合があり、また、再発を繰り返すこともあります。しかし、抗菌薬で治療しない限り、病原体は体内に残っており、梅毒が治ったわけではありません。

アレルギー、風しん、麻しん等に間違えられることもあります。この時期に適切な治療を受けられなかった場合、数年後に複数の臓器の障がいにつながる場合があります。



(写真)感染から約3か月後、全身に痛くもかゆくもないピンク色の発しんが出ている様子(バラ疹)



(写真)感染から約3か月後、手のひらに痛くもかゆくもないカサカサした斑点が出ている様子(バラ疹)

写真提供:一般社団法人日本性感染症学会

晩期顕性梅毒:感染後数年

感染後、数年を経過すると、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生することがあります。また、心臓、血管、脳などの複数の臓器に病変が生じ、場合によっては死亡に至ることもあります。

現在では、比較的早期から治療を開始する例が多く、抗菌薬が有効であることなどから、晩期顕性梅毒に進行することはほとんどありません。

この情報に関連する情報

[梅毒に関するQ&A\(厚生労働省ホームページ\)\(新しいウィンドウで開きます\)](#)

[ストップ！梅毒\(一般社団法人日本性感染症学会ホームページ\)\(新しいウィンドウで開きます\)](#)

このページに関するお問い合わせ先

[がん感染症疾病対策課](#)

感染症対策係

Tel:092-643-3597

福岡県内のエイズ・性感染症の検査実施保健所 一覧

現在、新型コロナウイルス感染症への対応のため、一部の保健所で検査を休止しています。

検査をご希望の場合は、保健所に検査を実施しているかご確認ください。



エイズ(HIV)・性感染症の検査は

無料・匿名 で受けることができます



エイズは性感染症の一つで、誰でも感染する可能性があります。

エイズも性感染症も早期発見が大事です。検査を受けに行きましょう！

保健所	相談電話 (エイズホットライン) (エイズダイヤル)	定例検査 (年間を通じて検査しています)						
		曜日	時間	備考	検査項目			
					HIV	梅毒	クラミジア	淋菌
北九州市	北九州市保健所	第1月 休日の場合は第2月 6・12月は 第1日曜	17:00~19:00	要予約 先着25名	★			
	小倉北区役所	火	9:00~11:00	要予約 先着50名	○	○	○	
	八幡西区役所	水	9:00~11:00	要予約	○	○	○	
福岡市	東区保健福祉センター	第1・3火	9:00~11:00		○	○	△	
	博多区保健福祉センター	第2・4木	9:00~11:00		○	○	△	
		第2・4水	16:00~18:00		○	○	△	
	中央区保健福祉センター	第1・3火	9:00~11:00	要予約	★			
	南区保健福祉センター	第1・3火	9:00~11:00		○	○	△	
	城南区保健福祉センター	第1・3水	9:00~11:00		○	○	△	
	早良区保健福祉センター	第1・3水	9:00~11:00		○	○	△	
	西区保健福祉センター	第1・3月	9:00~11:00		○	○	△	
久留米市保健所	0942-30-9340 (性感染症相談ダイヤル)	第2・4水	9:00~11:00	要予約	○	○	○	
福岡県 保健福祉 (環境) 事務所	筑紫保健福祉環境事務所	火	9:00~11:00	要予約	★	★	△	△
	粕屋保健福祉事務所	火	9:00~11:00	要予約	○	○	△	△
	糸島保健福祉事務所	火	10:00~11:00	要予約	○	○	△	△
	宗像・遠賀保健福祉環境事務所	火	9:00~11:00	要予約	○	○	△	△
		月	14:00~15:30	要予約	○	○	△	△
	嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所	火	9:00~10:00	要予約	★	★	△	△
		月	14:30~15:30	要予約	○	○	△	△
	田川保健福祉事務所 (別館で実施)	第2・3火	9:00~11:00	要予約	★	★	△	△
	北筑後保健福祉環境事務所	月	9:30~10:30	要予約	★	★	△	△
		火	9:00~10:00		★	★	△	△
	南筑後保健福祉環境事務所	火	10:00~11:00	要予約	★	★	△	△
		月	14:00~15:00	要予約	○	○	△	△
	京築保健福祉環境事務所	火	9:00~10:00	要予約	★	★	△	△

「検査項目」マークの意味と補足

- ★：血液検査(結果は約1時間後)、無料
- ：血液検査(結果は1週間後。福岡市のみ2週間後)、無料
- △：尿検査(結果は1週間後。福岡市のみ2週間後)、無料

検査について、不明な点や詳しく知りたい場合は、各保健所へお問い合わせください。

